

Engels raai gras – laat doorschietend

Overzicht van de raseigenschappen (gemiddelde resultaten)

Rubricering ¹⁾	Rasnaam	Gemiddelde doorschietdatum	Standvastigheid	Wintervastheid	Resistentie tegen kroonroest	Droge stofopbrengst van de eerste snede (relatief)	Droge stofopbrengst (relatief), gewogen gemiddelde van beweidings- en maaiproefvelden
Diploïde rassen							
A	Romark	3-6	8,1	7,3	7,7	100	104
A	Burlina 1	3-6	8,0	7,1	7,5	100	103
A	Jalinas	3-6	8,1	6,8	7,6	104	102
A	Asturion	4-6	8,1	7,0	7,9	103	101
A	Tornado	4-6	8,2	7,5	7,4	99	102
A	Tomaso	3-6	8,3	7,3	7,5	101	101
A	Astorga	4-6	8,1	7,1	8,4	92	99
A	Candia	3-6	8,3	6,9	7,6	98	100
B	Famoso	5-6	8,2	7,3	6,7	101	103
B	Melland	5-6	8,4	6,4	7,4	98	100
B	Cadans	8-6	8,0	7,5	8,1	95	98
B	Barnhem	7-6	8,2	7,2	7,3	88	99
B	Barleone	7-6	8,7	7,5	7,4	87	97
N	Bakuri 1	6-6	8,1	7,5	8,5	98	99
N	Candore	5-6	8,3	7,0	8,2	98	101
Tetraploïde rassen							
A	Polim	3-6	7,7	7,4	8,6	107	99
A	Herbal	5-6	7,8	7,4	8,1	100	100
A	Barmaxima	4-6	7,9	7,4	7,3	98	101
A	Bocage	3-6	8,1	7,7	9,1	101	97
A	Cabriolet	7-6	7,6	6,5	9,0	100	97
B	Barsaxo	4-6	8,2	7,6	8,1	100	97
B	Fornido	4-6	7,6	6,6	8,3	100	97
B	Altius	6-6	8,1	7,8	7,7	98	98
B	Barsintra	9-6	7,9	7,6	9,0	97	95
N	Barpasta	3-6	8,1	7,6	8,4	105	100
N	Alcander	4-6	7,9	7,5	9,0	100	99
N	Como	7-6	7,5	7,3	8,1	100	101
Nieuw in Rassenlijst 2010							
Diploïd ras							
N	Humbi 1	5-6	7,8	7,1	8,3	100	103
Tetraploïde ras							
N	Rivaldo	3-6	8,1	7,5	8,8	104	103

Engels raagras - middentijds doorschietend

Overzicht van de raseigenschappen (gemiddelde resultaten)

Rubricering ¹⁾	Rasnaam	Gemiddelde doorschietdatum	Standvastigheid	Wintervastheid	Resistentie tegen kroonroest	Droge stofopbrengst van de eerste snede (relatief)	Droge stofopbrengst (relatief), gewogen gemiddelde van beweidings- en maaiproefvelden
Diploïde rassen							
A	Calvano 1	25-5	8,1	6,8	7,6	106	105
A	Arsenal	24-5	8,2	7,2	8,0	103	103
A	Abosan 1	30-5	8,5	7,4	8,7	97	102
A	Option	26-5	8,2	7,1	8,7	99	100
A	Chicago	23-5	8,5	7,1	7,5	100	102
A	Domiatto 1	28-5	7,9	6,7	8,6	98	100
A	Frisian 1	24-5	7,8	6,8	8,3	103	100
A	Sibasa	25-5	8,1	7,2	8,3	102	100
B	Foresto	25-5	8,1	7,4	7,2	101	102
B	Honroso	30-5	8,3	7,2	7,9	90	101
B	Orantas	24-5	8,0	7,1	7,8	101	100
B	Barata	23-5	7,8	7,1	7,6	102	101
B	Gandalf	23-5	7,7	6,2	7,1	100	102
B	Alvaro	26-5	8,0	7,0	7,8	98	99
B	Avilena 1	29-5	7,9	7,3	7,3	96	101
B	Mateon 1	2-6	8,2	7,1	7,9	88	100
B	Laguna	26-5	7,9	7,3	7,7	97	98
B	Denver	30-5	8,1	7,1	7,5	94	99
B	Patricio	29-6	8,3	7,2	7,5	91	98
B	Marley	31-5	8,2	7,3	7,5	90	97
B	Baremon	26-5	8,4	7,6	7,4	90	93
N	Rodrigo	25-5	8,2	7,2	7,5	105	103
N	Toronto	24-5	8,1	7,2	7,8	107	102
N	Gasata 1	1-6	8,2	7,1	8,2	93	99
N	Maestro	31-5	8,2	6,9	8,1	90	98
Tetraploïde rassen							
A	Pomposo	25-5	7,9	7,3	8,6	101	100
A	Trivos	25-5	7,6	6,7	8,9	103	99
A	Roy	24-5	8,1	7,1	7,9	103	99
A	Barelan	1-6	8,0	7,6	8,9	93	97
A	Modane	31-5	8,2	7,5	8,2	96	98
B	Cantalou	25-5	7,7	7,4	8,7	101	97
B	Barnauta	26-5	8,0	7,9	7,9	103	97
B	Elgon	1-6	7,7	7,5	7,9	95	97
N	Maurizio	24-5	8,3	7,5	8,7	110	102
N	Reality	28-5	8,0	7,5	8,6	99	99
N	Channi 1	30-5	7,5	7,5	9,1	99	98
N	Catabi 1	27-5	7,4	7,2	8,6	106	99
N	Charlene	25-5	8,0	7,0	8,9	98	98
N	Turmalin	30-5	8,2	7,4	8,6	97	98
Nieuw in Rassenlijst 2010							
Tetraploïde rassen							
N	Besser	25-5	8,0	7,4	8,4	107	101
N	Novello	2-6	8,1	7,2	8,8	95	101
N	Ovambo 1	27-5	8,0	7,4	8,8	105	100

¹⁾ Rubricering in de Rassenlijst: A = algemeen aanbevolen ras; B = beperkt aanbevolen ras; N = nieuw aanbevolen ras.

Een hoog cijfer duidt op een gunstige waardering van de betrokken eigenschap.

Het onderzoek is uitgevoerd door de Animal Sciences Group te Lelystad.

Publicatie van de tabellen is toegestaan, mits de gegevens integraal en onder vermelding van 'Productschap Akkerbouw' worden overgenomen.

